Meloxivet 1 mg
Pequeno porte

USO VETERINÁRIO
USO ORAL
MELOXICAM

Meloxivet 1 mg – Pequeno Porte é um produto à base de Meloxicam, que é um analgésico e anti-inflamatório não-esteroide (AINE) pertencente à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxicam. Também possui ação antipirética.
O Meloxicam inibe a biossíntese de prostaglandinas mais intensamente no local da inflamação que na mucosa gástrica ou nos rins. Acredita-se que este perfil favorável de segurança esteja relacionado a uma inibição preferencial pela cicloxigenase-2 (COX-2) em relação à cicloxigenase-1 (COX-1). Acumulam-se evidências demostrando que a inibição da COX-2 proporciona os efeitos terapêuticos dos anti-inflamatórios não-esteroides, enquanto a inibição da COX-1 é responsável pelos efeitos colaterais gástricos e renais. Estudos clínicos demostraram pouca incidência de reações gastrintestinais com as doses recomendadas de Meloxicam que com as doses usuais de outros AINEs.
Meloxicam é bem absorvido depois da administração oral. Alimentos não alteram sua absorção.

Fórmula: Cada comprimido de 100 mg contém:
Meloxicam ..... 1 mg
Excipiente q.s.p. ..... 100 mg

Indicações:
Meloxivet 1 mg – Pequeno Porte é indicado para o tratamento e alívio da dor e da inflamação em patologias agudas ou crônicas associadas ao sistema musculoesquelético de cães e gatos: analgesia pós-cirúrgica, luxações, ruptura de ligamento, fraturas, claudicações, entorses, traumatismo, biópsias ósseas, osteossarcoma, necrose asséptica da cabeça do fêmur, osteoartrites, artrites, artroses, displasias e cistite intersticial.

Modo de usar:
Destacar o comprimido de **Meloxivet 1 mg – Pequeno Porte** do strip no momento da aplicação e administrá-lo por via oral, diretamente na boca do animal.

Posologia:
Seguir a tabela:

PESO DO ANIMAL	QUANTIDADE DE COMPRIMIDOS	
	1º Dia de tratamento	Dias seguintes de tratamento
Até 5,0 kg	1 comprimido	½ comprimido
De 5,1 a 10,0 kg	2 comprimidos	1 comprimido
De 10,1 a 15,0 kg	3 comprimidos	1 e ½ comprimido
De 15,1 a 20,0 kg	4 comprimidos	2 comprimidos

A duração do tratamento é variável, em média de 5 a 14 dias para cães e 3 a 4 dias para gatos, dependendo da resposta clínica do animal, sendo que, após este período, o Médico Veterinário deverá avaliar o caso.

Efeitos colaterais:
Distúrbios gastrintestinais podem ser mais comuns (vômitos, diarreia e anorexia), mas aparentemente são transitórios, desaparecendo na interrupção ou após a finalização do tratamento.

Contraindicações:
Não deve ser indicada para animais hipersensíveis ao Meloxicam ou com ativas ulcerações gastrintestinais ou sangramento, enfraquecida função hepática, cardíaca ou renal e desordens hemorrágicas.
Não é recomendado o uso em fêmeas prenhes ou em lactação, ou em animais com menos de 6 semanas de idade.
Não administrar o produto em associação com drogas anticoagulantes ou no caso de intoxicação com as mesmas.

Interações medicamentosas:
Devido à alta ligação de Meloxicam às proteínas plasmáticas, ele pode substituir ou ser substituído por outras drogas também altamente ligadas à proteína, incluindo warfarin , fenilbutazona, etc.
Meloxicam pode inibir a agreção plaquetária e também causar ulceração gastrintestinal, se usado com outras drogas que alteram a hemostasia (ex.: heparina, warfarin , etc.) e/ou causam erosão gastrintestinal (ex.: aspirina, flunixin, fenilbutazona, corticosteroides,etc.), aumentando a probabilidade de sangramento ou ulceração.

Antagonismo:
Meloxicam pode antagonizar os efeitos anti-hipertensivos dos inibidores da acepromazina.

Precauções:
Ter cautela em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, devido ao potencial risco de desenvolvimento de toxicidade renal.

Intoxicação e superdosagem em animais:
Não há informação específica, sugere-se tratar sintomaticamente e com suporte geral.

Intoxicação no Homem:
Em caso de ingestão acidental, procurar imediatamente o médico. Não existe um antídoto específico.

Apresentação:
Cartucho contendo 1 strip aluminizado contendo 10 comprimidos de 100 mg cada e cartucho contendo 12 strips aluminizados contendo 120 comprimidos de 100 mg cada.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 8.953 em 19/08/2004
Responsável Técnico: Landila Adriana Meyer – CRMV/RJ nº 4.501

Proprietário e Fabricante:
LABORATÓRIOS DUPRAT LTDA.
Av. Presidente Tancredo Neves, s/nº
Cidade Jardim Marajoara – Engenheiro Pedreira
Japeri – RJ
CEP 26410-050 – CNPJ: 32.465.155/0004-32
Indústria Brasileira / Marca Registrada

SAC: (21) 2664-2761 / 2664-6706
www.laboratorio-duprat.com.br

duprat

PRODUTO:	Meloxivet 1 mg	**DATA:**	19/02/2021
CÓDIGO:	195	**VERSÃO:**	08
CÓD. EAN13:	N/A	**DESIGNER:**	Amanda Bragard
SOFTWARE:	Adobe Illustrator CC	**VERSÃO:**	08
Nº DE CORES:	1	**VER. ANTIGA:**	07
DIMENSÕES:	90 x 150 mm	**RAZÃO DA ALTERAÇÃO:**	Alteração nome de bactéria.
FONTES:	Helvetica Neue LT STD; Folks		
REF. DE COR:	■ Black 100%	**APROVADO POR:**	duprat
REF. GRÁFICA:	☐ Faca	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	**DATA:**
		CONTROLE DE QUALIDADE:	**DATA:**

Meloxivet 2 mg
Médio porte

USO VETERINÁRIO
USO ORAL
MELOXICAM

Meloxivet 2 mg - Médio Porte é um produto à base de Meloxicam, que é um analgésico e anti-inflamatório não-esteroide (AINE) pertencente à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxicam. Também possui ação antipirética.
O Meloxicam inibe a biossíntese de prostaglandinas mais intensamente no local da inflamação que na mucosa gástrica ou nos rins. Acredita-se que este perfil favorável de segurança esteja relacionado a uma inibição preferencial pela cicloxigenase-2 (COX-2) em relação à cicloxigenase-1 (COX-1). Acumulam-se evidências demostrando que a inibição da COX-2 proporciona os efeitos terapêuticos dos anti-inflamatórios não-esteroides, enquanto a inibição da COX-1 é responsável pelos efeitos colaterais gástricos e renais. Estudos clínicos demostraram pouca incidência de reações gastrintestinais com as doses recomendadas de Meloxicam que com as doses usuais de outros AINEs.
Em cães, Meloxicam é bem absorvido depois da administração oral. Alimentos não alteram sua absorção.

Fórmula: Cada comprimido de 100 mg contém:
Meloxicam ..... 2 mg
Excipiente q.s.p. ..... 100 mg

Indicações:
Meloxivet 2 mg - Médio Porte é indicado para o tratamento e alívio da dor e da inflamação em patologias agudas ou crônicas associadas ao sistema musculoesquelético de cães: analgesia pós-cirúrgica, luxações, ruptura de ligamento, fraturas, claudicações, entorses, traumatismo, biópsias ósseas, osteossarcoma, necrose asséptica da cabeça do fêmur, osteoartrites, artrites, artroses, displasias e cistite intersticial.

Modo de usar:
Destacar o comprimido de **Meloxivet 2 mg - Médio Porte** do strip no momento da aplicação e administrá-lo por via oral, diretamente na boca do animal.

Posologia:
CÃES:
- Osteoartrites, analgesia e condições inflamatórias: 0,2 mg/kg, via oral, uma vez inicialmente, seguida por 0,1 mg/kg, via oral, uma vez ao dia (junto à refeição),
- Analgesia pós-cirúrgica: 0,1 mg/kg, via oral, uma vez ao dia,
- Dor crônica: 0,2 mg/kg via oral, uma vez inicialmente, seguida por 0,1 mg/kg, via oral, uma vez ao dia.

A duração do tratamento é variável, em média de 5 a 14 dias, dependendo da resposta clínica do animal, sendo que, após este período, o Médico Veterinário deverá avaliar o caso.

Efeitos colaterais:
Distúrbios gastrintestinais podem ser mais comuns (vômitos, diarreia e anorexia), mas aparentemente são transitórios, desaparecendo na interrupção ou após a finalização do tratamento.

Contraindicações:
Não deve ser indicada para animais hipersensíveis ao Meloxicam ou com ativas ulcerações gastrintestinais ou sangramento, enfraquecida função hepática, cardíaca ou renal e desordens hemorrágicas.
Não é recomendado o uso em fêmeas prenhes ou em lactação, ou em animais com menos de 6 semanas de idade.
Não administrar o produto em associação com drogas anticoagulantes ou no caso de intoxicação com as mesmas.

Interações medicamentosas:
Devido à alta ligação de Meloxicam às proteínas plasmáticas, ele pode substituir ou ser substituído por outras drogas também altamente ligadas à proteína, incluindo warfarim, fenilbutazona, etc.
Meloxicam pode inibir a agreção plaquetária e também causar ulceração gastrintestinal, se usado com outras drogas que alteram a hemostasia (ex.: heparina, warfarim, etc.) e/ou causam erosão gastrintestinal (ex.: aspirina, flunixin, fenilbutazona, corticosteroides,etc.), aumentando a probabilidade de sangramento ou ulceração.

Antagonismo:
Meloxicam pode antagonizar os efeitos anti-hipertensivos dos inibidores da acepromazina.

Precauções:
Ter cautela em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, devido ao potencial risco de desenvolvimento de toxicidade renal.

Intoxicação e superdosagem em animais:
Não há informação específica, sugere-se tratar sintomaticamente e com suporte geral.

Intoxicação no Homem:
Em caso de ingestão acidental, procurar imediatamente o médico. Não existe um antídoto específico.

Apresentação:
Cartucho contendo 1 strip aluminizado contendo 10 comprimidos de 100 mg cada e cartucho contendo 12 strips aluminizados contendo 120 comprimidos de 100 mg cada.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 8.955 em 19/08/2004
Responsável Técnico: Landila Adriana Meyer – CRMV/RJ nº 4.501

Proprietário e Fabricante:
LABORATÓRIOS DUPRAT LTDA.
Av. Presidente Tancredo Neves, s/nº
Cidade Jardim Marajoara – Engenheiro Pedreira
Japeri – RJ
CEP 26410-050 – CNPJ: 32.465.155/0004-32
Indústria Brasileira / Marca Registrada

SAC: (21) 2664-2761 / 2664-6706
www.laboratorio-duprat.com.br

duprat

PRODUTO:	Meloxivet 2 mg
CÓDIGO:	196
CÓD. EAN13:	N/A
SOFTWARE:	Adobe Illustrator CC
Nº DE CORES:	1
DIMENSÕES:	90 x 150 mm
FONTES:	Helvetica Neue LT STD; Folks
REF. DE COR:	■ Black 100%
REF. GRÁFICA:	☐ Faca

DATA:	27/05/2021
VERSÃO	09
DESIGNER:	Amanda
VERSÃO:	09
VER. ANTIGA:	08
RAZÃO DA ALTERAÇÃO:	Alteração de logotipo.
APROVADO POR:	duprat
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**DATA:**
CONTROLE DE QUALIDADE:	**DATA:**

gqdgroup.com.br

Meloxivet 6 mg
Grande porte

USO VETERINÁRIO
USO ORAL
MELOXICAM

Meloxivet 6 mg - Grande Porte é um produto à base de Meloxicam, que é um analgésico e anti-inflamatório não-esteroide (AINE) pertencente à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxicam. Também possui ação antipirética.
O Meloxicam inibe a biossíntese de prostaglandinas mais intensamente no local da inflamação que na mucosa gástrica ou nos rins. Acredita-se que este perfil favorável de segurança esteja relacionado a uma inibição preferencial pela cicloxigenase-2 (COX-2) em relação à cicloxigenase-1 (COX-1). Acumulam-se evidências demostrando que a inibição da COX-2 proporciona os efeitos terapêuticos dos anti-inflamatórios não-esteroides, enquanto a inibição da COX-1 é responsável pelos efeitos colaterais gástricos e renais. Estudos clínicos demostraram pouca incidência de reações gastrintestinais com as doses recomendadas de Meloxicam que com as doses usuais de outros AINEs.
Em cães, Meloxicam é bem absorvido depois da administração oral. Alimentos não alteram sua absorção.

Fórmula: Cada comprimido de 100mg contém:
Meloxicam ..... 6 mg
Excipiente q.s.p. ..... 100 mg

Indicações:
Meloxivet 6 mg - Grande Porte é indicado para o tratamento e alívio da dor e da inflamação em patologias agudas ou crônicas associadas ao sistema musculoesquelético de cães: analgesia pós-cirúrgica, luxações, ruptura de ligamento, fraturas, claudicações, entorses, traumatismo, biópsias ósseas, osteossarcoma, necrose asséptica da cabeça do fêmur, osteoartrites, artrites, artroses, displasias e cistite intersticial.

Modo de usar:
Destacar o comprimido de **Meloxivet 6 mg - Grande Porte** do strip no momento da aplicação e administrá-lo por via oral, diretamente na boca do animal.

Posologia:
CÃES:
- Osteoartrites, analgesia e condições inflamatórias: 0,2 mg/kg, via oral, uma vez inicialmente, seguida por 0,1 mg/kg, via oral, uma vez ao dia (junto a refeição),
- Analgesia pós-cirúrgica: 0,1 mg/kg, via oral, uma vez ao dia,
- Dor crônica: 0,2 mg/kg, via oral, uma vez inicialmente, seguida por 0,1 mg/kg, via oral, uma vez ao dia.

A duração do tratamento é variável em média de 5 a 14 dias, dependendo da resposta clínica do animal sendo que após este período o Médico Veterinário deverá avaliar o caso.

Efeitos Colaterais:
Distúrbios gastrintestinais podem ser mais comuns (vômitos, diarreia e anorexia), mas aparentemente são transitórios, desaparecendo na interrupção ou após a finalização do tratamento.

Contraindicações:
Não deve ser indicada para animais hipersensíveis ao Meloxicam ou com ativas ulcerações gastrintestinais ou sangramento, enfraquecida função hepática, cardíaca ou renal e desordens hemorrágicas.
Não é recomendado o uso em fêmeas prenhes ou em lactação, ou em animais com menos de 6 semanas de idade.
Não administrar o produto em associação com drogas anticoagulantes ou no caso de intoxicação com as mesmas.

Interações medicamentosas:
Devido à alta ligação de Meloxicam às proteínas plasmáticas, ele pode substituir ou ser substituído por outras drogas também altamente ligadas à proteína, incluindo warfarim, fenilbutazona, etc.
Meloxicam pode inibir a agreção plaquetária e também causar ulceração gastrintestinal, se usado com outras drogas que alteram a hemostasia (ex.: heparina, warfarim, etc.) e/ou causam erosão gastrintestinal (ex.: aspirina, flunixin, fenilbutazona, corticosteroides,etc.), aumentar a probabilidade de sangramento ou ulceração.

Antagonismo:
Meloxicam pode antagonizar os efeitos anti-hipertensivos dos inibidores da acepromazina.

Precauções:
Ter cautela em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, devido ao potencial risco de desenvolvimento de toxicidade renal.

Intoxicação e superdosagem em animais:
Não há informação especifica; sugere-se tratar sintomaticamente e com suporte geral.

Intoxicação no Homem:
Em caso de ingestão acidental, procurar imediatamente o médico, não existe um antídoto específico.

Apresentação:
Cartucho contendo 1 strip aluminizado contendo 10 comprimidos de 100 mg cada e cartucho contendo 12 strips aluminizados contendo 120 comprimidos de 100 mg cada.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 8.954 em 19/08/2004
Responsável Técnico: Landila Adriana Meyer – CRMV/RJ nº 4.501

Proprietário e Fabricante:
LABORATÓRIOS DUPRAT LTDA.
Av. Presidente Tancredo Neves, s/nº
Cidade Jardim Marajoara – Engenheiro Pedreira
Japeri – RJ
CEP 26410-050 – CNPJ: 32.465.155/0004-32
Indústria Brasileira / Marca Registrada

SAC: (21) 2664-2761 / 2664-6706
www.laboratorio-duprat.com.br

duprat

PRODUTO:	BU Meloxicam 6mg	**DATA:**	30/06/21
CÓDIGO:	197-07	**VERSÃO:**	2
CÓDIGO EAN13:		**DESIGNER:**	Amanda Bragard
SOFTWARE:	Adobe Illustrator CC	**VERSÃO:**	2
Nº DE CORES:	1	**VER. ANTIGA:**	1
DIMENSÕES:	90 x 150 mm	**RAZÃO DA ALTERAÇÃO:**	Alteração de logomarca.
FONTES:	Helvetica Neue LT Std		
REF. DE COR:	■ BLACK	**APROVADO POR:**	duprat
REF. GRÁFICA:	☐ FACA	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	**DATA:**
		CONTROLE DE QUALIDADE:	**DATA:**