eurofarma

FloRipa

SUPLEMENTO ALIMENTAR DE *BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SUBSP. LACTIS BB12®* (DSM 15954) EM GOTAS

6

gotas ao dia

Contribui com a saúde do trato gastrointestinal.

YOUR HEALTH – OUR SCIENCE
BB-12™
By Chr. Hansen

NÃO CONTÉM AÇÚCARES
NÃO CONTÉM GLÚTEN

FloRipa

1. O que é FLORIPA?

Suplemento Alimentar de *Bifidobacterium Animalis Subsp. Lactis BB12*® (DSM 15954) em gotas, que contribui com a saúde do trato gastrointestinal.

Recomendações de uso: Uso para crianças a partir de 0 meses de idade, adultos acima de 19 anos e gestantes. Consumir 6 gotas ao dia. **Agite bem antes de usar.**

Instruções de uso e armazenamento:

1. 

Agite bem o frasco de **FLORIPA** antes de usar.
• Antes do primeiro uso, agite o frasco por 60 segundos.
• Para cada uso subsequente, agite o frasco por 10 segundos.

2. 

Vire o produto com o conta-gotas de cabeça para baixo, no ângulo de 90 graus.

3. 

Goteje as 6 gotas diretamente na boca do bebê. **Ou goteje as 6 gotas** em uma colher e administre ao bebê.

Ao finalizar o consumo de FLORIPA:

Mantenha o produto em lugar seco, protegido da luz e do calor excessivo. Manter a embalagem sempre bem fechada. Após aberto, consumir o produto em até 28 dias. Não é necessário refrigerar.
Recomenda-se manter **FLORIPA** armazenado na vertical. O armazenamento na horizontal pode resultar em bloqueio do gotejador. Caso o gotejador fique bloqueado, agite o frasco por 60 segundos.

FloRipa

O *Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12®* (DSM 15954) contribui com a saúde do trato gastrointestinal. **Cada 6 gotas contêm 1 bilhão (1x109 UFC) de *Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12®* (DSM 15954).**

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL	**0 a 11 meses** Porções por emb.: Cerca de 30 Porção: 0,27 ml (6 gotas)		**1 a ≥ 19 anos e Gestantes** Porções por emb.: Cerca de 30 Porção: 0,27 ml (6 gotas)	
	0,27 ml	**% VD***	**0,27 ml**	**% VD***
Carboidratos (g)	0	0	0	0
Açúcares totais (g)	0		0	
Aç adicionados (g)	0		0	
Não contém quantidades significativas de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras e sódio.				
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.				

Ingredientes

Óleo de girassol, Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12® (DSM 15954). **NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

2 - O que são probióticos e como ele funciona?

Os probióticos são microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do indivíduo[1]. Eles equilibram a microbiota intestinal, interagindo com o sistema imunológico inato e adaptativo,

interagindo com microrganismos comensais ou potencialmente patogênicos[6].

3- Qual a cepa do FLORIPA? Quais os seus benefícios?

A cepa de FLORIPA é o *Bifidobacterium animalis subsp. lactis,* BB-12™ (DSM 15954) e os benefícios demonstrados através de estudos científicos contemplando recém-nascidos, crianças e idosos, foram a eficácia na melhora e manutenção de função intestinal[2-4], na cólica infantil[2], menor incidência de diarreia[3] e a constipação[4], na melhora da função imunológica[5], na diminuição de infecções respiratórias comuns[6] e benefícios na resposta imune após vacinação contra gripe (Influenza)[7].

4- Cólica infantil, sua importância:

A cólica infantil é tipicamente definida como choro forte por pelo menos três horas por dia, pelo menos três dias por semana, por pelo menos três semanas[8]. A cólica infantil afeta grande número de bebês (5 a 20%) e suas famílias em todo o mundo. A população acometida é composta principalmente por crianças com menos de cinco meses de idade quando os sintomas começam e param, períodos recorrentes e prolongados de choro infantil, agitação ou irritabilidade que ocorrem sem qualquer causa clara[9].

Há evidências crescentes que sugerem que a flora intestinal em bebês com cólica difere daquelas em bebês saudáveis, e sugere-se que os probióticos podem auxiliar a restaurar esse equilíbrio e fornecer uma paisagem da microbiota intestinal mais saudável. A fácil disponibilidade de probióticos os torna uma

solução profilática potencial para auxiliar a reduzir a incidência e prevalência de cólica infantil[7].

5- *Bifidobacterium animalis subsp. lactis,* BB-12™, evidências científicas na cólica infantil:

O estudo controlado randomizado duplo cego publicado em 2020 demonstrou que o *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* BB-12 (1×10^9 UFC/dia) em bebês lactentes durante 28 dias reduziu a duração média do choro diário, o número de episódios de choro. A taxa de bebês com redução da duração de choro foi 80% do grupo BB-12™ e 31,5% do grupo placebo. Em relação a avaliação da microbiota, houve um aumento significativo de *Bifidobacterium* apenas nos bebês tratados com BB-12™, a variação de *Bifidobacterium subsp. lactis,* BB-12™ induzido pelo uso com **BB-12™** foi correlacionado significativamente com a redução de choro[2].

A suplementação com **BB-12™** é eficaz no controle das cólicas infantis. O efeito dos probióticos pode derivar de mecanismos imunes e não imunes associados a uma modulação da estrutura e função da microbiota intestinal[2].

Outras evidências durante a primeira infância:

Estudos clínicos mostraram que a suplementação com o BB-12™ pode reduzir a diarreia[3], fortalecer as respostas imunes[5] e diminuir a incidência e duração de infecções respiratórias de bebês até 2 anos de idade[6].

Este produto não é um medicamento.
Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
Mantenha fora do alcance de crianças.
Este produto não deve ser consumido por pessoas imunocomprometidas ou acometidas de condição de saúde debilitante grave.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: APÓS OS 6 (SEIS) MESES DE IDADE CONTINUE AMAMENTANDO SEU FILHO E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 6 (SEIS) MESES DE IDADE, A NÃO SER POR INDICAÇÃO EXPRESSA DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS.

Conservação

Mantenha o produto em lugar seco, protegido da luz e do calor excessivo. Manter a embalagem sempre bem fechada. Após aberto, consumir o produto em até 28 dias. Não é necessário refrigerar.

FloRipa

Referências

1. Diretrizes Mundiais da Organização Mundial de Gastroenterologia. Probióticos e Prebióticos. 2017

2. Nocerino R, De Filippis F, Cecere G, et al. The therapeutic efficacy **of *Bifidobacterium animalis subsp. lactis,* BB-12™** in infant colic: A randomised, double blind, placebo-controlled trial. Aliment Pharmacol Ther. 2020 Jan;51(1):110-120.

3. Chouraqui JP, Van Egroo LD, Fichot MC. Acidified milk formula supplemented with bifidobacterium lactis: impact on infant diarrhea in residential care settings. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004 Mar;38(3):288-92.

4. Eskesen, Dorte et al. Effect of the Probiotic Strain ***Bifidobacterium Animalis* Subsp. *lactis*, BB-12™,** on Defecation Frequency in Healthy Subjects with Low Defecation Frequency and Abdominal Discomfort: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Trial. *The British Journal of Nutrition* 114.10 (2015): 1638–1646.

5. Holscher HD, Czerkies LA, Cekola P, et al. ***Bifidobacterium lactis,* BB-12™** enhances intestinal antibody response in formula-fed infants: a randomized, double-blind, controlled trial. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2012 Jan;36(1 Suppl):106S-17S.

6. Taipale TJ, Pienihäkkinen K, Isolauri E, et al. ***Bifidobacterium animalis subsp. lactis,* BB-12™** in reducing the risk of infections in early childhood. Pediatr Res. 2016 Jan;79(1-1):65-9.

7. Rizzardini G, Eskesen D, Calder PC, Capetti A, et al. Evaluation of the immune benefits of two probiotic strains ***Bifidobacterium animalis ssp. lactis,* BB-12™** and Lactobacillus paracasei ssp. paracasei, L. casei 431® in an influenza vaccination model: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Br J Nutr. 2012 Mar;107(6):876-84.

8. Ong TG, Gordon M, Banks SS, et al. Probiotics to prevent infantile colic. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Mar 13;3(3):CD012473.

9. Perry R, Leach V, Penfold C, Davies P. An overview of systematic reviews of complementary and alternative therapies for infantile colic. Syst Rev. 2019 Nov 11;8(1):271.

FloRipa

BB-12™ is a trademark of Chr. Hansen A/S

Fabricado na Dinamarca por:
CHR Hansen A/S
Soender Ringvej 22, Roskilde, 4000, Dinamarca

Importado e Distribuído por:
Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod. Pres. Castello Branco, 3.565 - Itapevi - SP
CNPJ: 61.190.096/0001-92
Indústria Brasileira

Central de atendimento: 0800 704 3876

eurofarma

Rev.02 (10/25)